## \*spice

## と命に関わ 破裂する 脳動脈瘤 !期的なMRA検査で早期発



濵武

濵武

最も安心して受けられるの

脳動脈瘤も検出できるようになりま

今ではわずか1㎜ほどの小さな

諭氏

脳の血管壁の弱い部分が徐々に膨れ 頭痛と吐き気に襲われます。約半数 なりバットで殴られたような激しい きあるものではなく、加齢とともに た状態を言います。これは生まれ の患者さんが死亡、または昏睡(ご てくるものです。 脳動脈瘤は破裂す 部が膨れて瘤(こぶ)のようにな すい)状態に陥るといわれてい たとえ治療が成功しても、 くも膜下出血を起こし、い 脳動脈瘤とは、 脳の動脈 重い

がいる場合、 出ています。家族に脳動脈瘤と診断 れた人と血縁関係(親子、祖父母、 方に、多く見つかるというデータも された方やくも膜下出血になった方 いえます。また、脳動脈瘤と診断さ 兄弟姉妹、いとこなど)にある 40歳になられたら

圧の管理、禁煙などが予防に必要と

約30分。注射などの痛みも無く、

寝

。脳動脈

ありますか。 検査されることをお勧めします。 検査方法にはどのようなものが

もあります。MRー装置の進歩によ

めるために、 ことが決まれば、

脳血管撮影を行うこと

適切な治療法を決

ます。脳動脈瘤が確定し、治療する い、その有無や状態をはっきりさせ 元CT血管撮影 (3D-CTA) を行 を用いて造影剤を注射しながら三次 が疑われた場合には、CTスキャン ているだけで終了します。

装置を用いて脳血管を映し出す方法

MRー(磁力を用いた断層撮影

た。

定期的な検査で、

脳動脈瘤の

早期治療を心掛けていき

MRA(磁気共鳴血管造影)と呼

ましょう。 早期発見、

とされています。 -手のしびれや言葉のもつれなど、

(りゅう)。特徴的な症状や原因、検査方法について聞きました。

脳動脈瘤の特徴的な症状は

前兆はないのですか。

未破裂の状態で見つけるには定期的 るまで何の症状もないのが特徴です。 濵武 脳動脈瘤の多くは、

30歳以上の約4~6%の人が罹患(りかん)しているといわれる脳動脈瘤 裂を起こしやすい因子として、 な検査を受けるしかありません。 圧や喫煙などが挙げられるため、 破裂す 高血 ſШ ばれています。 検査にかかる時間 MRA画像。矢印は脳動脈瘤